



28001300

产品说明书



號 战®

# 枸橼酸西地那非口崩片

核准日期: 2023年06月07日  
修改日期: 2023年07月14日

## 枸橼酸西地那非口崩片说明书 请仔细阅读说明书并在医师或药师指导下使用

**警示语:** 本品规格为 50mg, 不适用于起始剂量为 25mg 患者。  
**本品不能够掰开服用。**

### 【药品名称】

通用名称: 枸橼酸西地那非口崩片


英文名称: Sildenafil Citrate Ondispersible Tablets

汉语拼音: Juyuanshi Xidainafei Koubengpian

【成份】本品主要成分为枸橼酸西地那非。

化学名称: 1-(4-乙氨基-5-6,7-二氢-1-甲基-7-氧化-3-丙基-1-氨基-吡唑并[4,3-d]嘧啶-5-基)苯磺酰-4-甲基哌嗪枸橼酸盐。

化学结构式:



辅料包括: D-甘露糖、交联聚维酮、聚醋酸乙脂、聚维酮、微晶纤维素、交联羧甲纤维素钠、硬脂酸镁、丙酸二乙酯、三氯蔗糖、靛蓝铂色淀、草莓香精和柠檬香精。

【性状】本品为蓝色片剂。

【适应症】用于治疗勃起功能障碍。

【规格】50 mg (按  $C_23H_{30}N_4O_8S_2$  计)。

### 【用法用量】

#### 剂量

成人: 本品在性生活前约 1 小时服用。推荐剂量为 50mg。

基于药效和耐受性, 剂量可增至至 100mg (最大推荐剂量)。对于剂量需增加至 100mg 的患者, 可连服 2 片 50mg 片。推荐每日最多服用 1 次。在没有性刺激的情况下, 推荐剂量为西地那非 2 片。

#### 特殊人群用法

老年患者用法: 老年患者 ( $\geq 65$  岁) 起始剂量以 25mg 为宜。

肾功能损害患者用法: 对于轻度至中度肾功能损害 (肌酐清除率 = 30~80ml/分钟) 的患者, 推荐剂量同 “成人用法”。对于有重度肾功能损害 (肌酐清除率 &lt; 30ml/分钟) 的患者, 因而西地那非清除率下降, 因此可考虑起始剂量 25mg。

肝功能损害患者用法: 对于肝功能受损, 包括轻度、中度、重度, 不适用于已被建议禁止性生活的男性患者 (例如: 重度心脑血管疾病患者, 因而西地那非清除率降低)。

对于正在使用其他药物的患者的用法, 除不建议与那布韦与西地那非合用外 (见 “**注意事项**”), 同时接受 CYP3A4 抑制剂治疗的患者起始剂量为 25mg (见 “**药代动力学**”)。

西地那非可增强硝酸盐的降压作用, 故服用任何剂量的一氧化氮供体和硝酸盐的患者, 请禁服西地那非。

为尽可能减少体位性低血压的可能, 接受 a 受体阻滞剂治疗的患者在开始服用西地那非前, 应已用 a 受体阻滞剂治疗到达稳定状态。此外, 推荐的西地那非起始剂量为 25mg (见 “**药物相互作用**”)。

【给药方法】口服

将一片片剂置于舌上, 待其崩解后, 用水吞咽或直接吞咽。从包装中取出后应立即服用。

对于服用剂量为 100mg 的患者, 应在第一片完全崩解后, 再服用第二片 50mg 的口服片。

与餐食摄入无关, 口崩片与高脂饮食同服会引起显著的吸收延迟 (见 “**药代动力学**”)。推荐服用温服本品。本品可用温水服用或直接服用。

#### 【不良反应】

##### 安全性概况

西地那非的安全性特征基于 7 项双盲、安慰剂对照的临床研究中 9570 例患者的数据显示。

在临床研究中, 西地那非治疗组是报告最多的不良反应为头痛、潮红、消化不良、鼻充血、头晕、恶心、心慌、视觉模糊、蓝视症和皮肤干燥。

通常上市后监督收集的不良反应, 所涵盖时间超过 10 年。由于并非所有不良反应均为报告的报告会上许可持有人纳入安全性数据库, 因此无法可靠的确定这些反应的发生率。

#### 【不良反应】

下表列出了系统器官分类和发生率 (十分常见 (&gt;1/10), 常见 (&gt;1/100 至 &lt;1/10), 偶见 (&gt;1/1000 至 &lt;1/100), 极罕见 (&gt;1/10000 至 &lt;1/1000)) 列出了临床试验中发生率高于安慰剂的所有重要医学意义的不良反应。在每个频率组内按严重程度排序, 列出不良反应。

表 1: 对照临床研究中发生率大于安慰剂组的有重要医学意义的不良反应及经上市后监督报告为有重要医学意义的不良反应